

TETRAVET L.A.

СЪСТАВ в 1 мл:

Охутetracycline 200 000 IU

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Говеда, овце, свине: инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин бактерии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

На мястото на инжектиране може да се появят леки и преходни локални реакции (подутина, болка). За намаляването им се препоръчва да не се прилагат повече от 20 мл за говедата и повече от 10 мл за свинете на едно място. Ако е необходимо инжектиране на по-голям обем, това да става на няколко места.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, свине.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно инжектиране.

Доза: 200 000 IU охутetracycline/кг ж.т. като единична инжекция или 1 мл от разтвора на 10 кг ж.т..

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 21 дни.

Мляко: 7 дни (14 издожавания).

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под 25⁰ C.

Производител и притежател на лиценза за употреба

Ceva Sante Animale France, 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne Cedex, France